

Capital SH

Novità

- ▶ FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI PER LA PROTEZIONE DI MELO E PERO
- ▶ AZIONE PREVENTIVA MULTISITO DI CONTATTO CONTRO TICCHIOLATURA E MARCIUMI



COMPOSIZIONE
Captano 80%

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili (WG)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317; H318; H332; H351;
H400; EUH401;

REG. MIN. SALUTE
n° 16403 del 07.07.2015

CODICE FRAC
M04

BUFFER ZONE
Consultare l'etichetta



Pericolo

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Melo, Pero	Ticchiolatura, (<i>Venturia inaequalis</i>) <i>Gloeosporium</i> spp. <i>Monilia</i> spp.	1.88 kg/ha	Trattamenti preventivi dalla comparsa dei mazzetti fiorali (BBCH51/aprile). Rispettare un intervallo minimo fra i trattamenti di 10 giorni.	21 gg	7
Pesche e Nettarine (applicazioni tardive, "al verde")	Bolla del pesco (<i>Taphrina deformans</i>)	1.8 kg/ha	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere 14 giorni.	21 gg	2
Pesche, Nettarine e albicocche (applicazioni tardive, "al verde")	Marciume bruno (<i>Monilia</i> spp.)	1.8 kg/ha	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere 14 giorni.	21 gg	2

SACCHETTO 1 kg (cartone 10 pz) SACCO 5 kg (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Al fine di ridurre il rischio di fenomeni di fitotossicità, si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di Pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

