

Dribbling 240 EC

- ▶ ERBICIDA ATTIVO PER CONTATTO FOGLIARE E SUI GERMINELLI
- ▶ ELEVATA EFFICACIA SU NUMEROSE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI NON EMERSE O NEI PRIMI STADI DI SVILUPPO
- ▶ COMPATIBILE CON FORMULATI A BASE DI GLIFOSATE (GLIFENE HP)

COMPOSIZIONE

oxifluorfen 24,5% (240 g/l)

FORMULAZIONE

emulsione concentrata (EC)

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H315; H318; H410; EUH401

REG. MIN. SALUTE

n° 9575 del 30.03.1998

CODICE HRAC

E

BUFFER ZONE

Non previste



Pericolo

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	FASE D'INTERVENTO	PHI	ATTIVITÀ ERBICIDA
Nocciolo, Vite, Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo	1,875 l/ha 0,3-0,5 l/ha	- Pre-emergenza infestanti - Post-emergenza infestanti in miscela con glifosate (GLIFENE HP)	n.r.	Infestanti sensibili Graminacee <i>Avena</i> spp., <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Echinochloa</i> spp., <i>Lolium</i> spp., <i>Setaria</i> spp., <i>Poa annua</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i>
Olivo	1,875 l/ha 0,3-0,5 l/ha	- Pre-emergenza infestanti - Post-emergenza infestanti in miscela con glifosate (GLIFENE HP)	7 gg (avendo cura di ripulire il terreno dalle olive cadute)	Dicotiledoni <i>Oxalis</i> spp., <i>Amaranthus</i> spp., <i>Anagallis arvensis</i> , <i>Capsella bursa pastoris</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Solanum nigrum</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Calendula arvensis</i> , <i>Galinsoga perviflora</i> , <i>Sonchus arvensis</i> , <i>Mercurialis annua</i> , <i>Urtica</i> spp., <i>Papaver</i> spp., <i>Polygonum persicaria</i> , <i>Polygonum lapathifolium</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Datura stramonio</i> , <i>Stachys annua</i> , <i>Veronica</i> spp., <i>Ammi majus</i>
Girasole	1 l/ha	Pre-emergenza	n.r.	
Carciofo	1-1,5 l/ha 1,875 l/ha	- Pre-emergenza - Post-emergenza, distribuire con apposita schermatura	n.r.	
Vivai forestali ed ornamentali	1,875 l/ha	Pre-emergenza delle infestanti. Per la lotta al Convolvolo intervenire alla fioritura e sui ricacci (40-50 cm). Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima dell'emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.	n.r.	
Bordi stradali, Argini, Sedi ferroviarie	1,875 l/ha	- Infestanti non emerse - Post-emergenza infestanti in miscela con glifosate (GLIFENE HP)	n.r.	

Prodotto originale Ascenza

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)



AVVERTENZE

Su vigneti, frutteti e agrumeti impiegare il prodotto a partire dal secondo anno d'impianto e distribuirlo durante il periodo di dormienza (fino a 20 gg prima del germogliamento); in caso di innesto in prossimità del suolo impiegare a partire dal secondo anno di vegetazione. Su Vite, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Nocciolo, e Girasole possono manifestarsi sintomi di fitotossicità localizzati che non influenzano la produttività della coltura. Teme il gelo: conservare a temperature superiori a 0°C.

