

Lestra

- › ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER IL FRUMENTO TENERO E DURO E PER L'ORZO
- › AGISCE NEI CONFRONTI DELLE INFESTANTI A FOGLIA LARGA



COMPOSIZIONE
tribenuron metile 75%

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili (WG)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H373; H410; EUH208; EUH401

REG. MIN. SALUTE
n° 15662 del 20.12.2012

CODICE HRAC
B

BUFFER ZONE
Consultare l'etichetta



Attenzione

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	FASE D'INTERVENTO	PHI	ATTIVITÀ ERBICIDA
Frumento tenero e duro Orzo	10-15 g/ha	Intervenire in post-emergenza della coltura (dallo stadio di 3 foglie a botticella) e delle infestanti	Non trattare dopo la fase di foglia bandiera non avvolta al culmo, ligula appena visibile	Infestanti dicotiledoni sensibili <i>Anethum graveolens, Bifora radians, Capsella bursa pastoris, Diplotaxis spp., Matricaria chamomilla, Myagrum perfoliatum, Oxalis cernua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus, Rapistrum rugosum, Sinapis arvensis, Stellaria media</i>
	15 g/ha	Aggiungere bagnante allo 0,1% (VECTOR)		<i>Centaurea cyanus, Fumaria officinalis, Geranium dissectum, Lamium purpureum, Ranunculus spp., Rumex spp., Scandix pecten veneris, Veronica persica, Vicia spp., Viola tricolor</i>
	20 g/ha	In caso di forte infestazione, con aggiunta di bagnante allo 0,1% (VECTOR)		<i>Chrysanthemum segetum, Raphanus raphanistrum</i>



Prodotto originale Nufarm

10 BUSTINE + AST.
50 g (cartone 100 pz)

10 BUSTINE + AST.
10 g (cartone 100 pz)

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto su colture sofferenti per andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari, asfissia radicale. Dopo un trattamento con LESTRA si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Impiegare volumi d'acqua di 200-400 l/ha.

